

Vimkunya® Totimpfstoff mit VLP („Virus-Like-Particle“) -Technologie

Reise (R)

Die STIKO empfiehlt als Reiseimpfung (R) einen der beiden verfügbaren Impfstoffe gegen Chikungunya, den attenuierten Lebendimpfstoff Ixchiq® für Personen im Alter von **12 bis 59 Jahren** oder den **Totimpfstoff Vimkunya®** für Personen **≥12 Jahren**.

Für Personen ≥12 Jahre:

- die in ein Gebiet reisen, für das ein aktuelles Chikungunya-Ausbruchsgeschehen bekannt ist,
- die einen längeren Aufenthalt (> 4 Wochen) oder wiederholte Kurzaufenthalte in Chikungunya-Endemiegebieten planen **und** bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Chronifizierung oder einen schweren Verlauf der Erkrankung besteht (z.B. Alter ≥60 Jahre oder eine schwere internistische Grunderkrankung).

Für Personen ≥60 Jahre soll nur der Totimpfstoff verwendet werden.

Beruf (B)

Personen, die gezielte Tätigkeiten mit Chikungunya-Viren gemäß Biostoffverordnung ausüben (z.B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien), sollten eine Impfstoffdosis einer der beiden Impfstoffe unter Berücksichtigung der jeweiligen Altersgruppen als beruflich indizierte Impfung (B) erhalten.

**Mit Kamera scannen
um STIKO-Empfehlung
aufzurufen:**



[https://bn-url.com/
stiko-empfehlung](https://bn-url.com/stiko-empfehlung)



Zudem empfiehlt das RKI allen Reiserückkehrern nach Deutschland im Sommer sowie Frühherbst vorsorglich auch bei Symptommfreiheit 14 Tage nach der Reise Mückenschutz zu nutzen, um autochthone Transmission zu vermindern.*

*Epidemiologisches Bulletin 14/2025, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V. (DTG) zu Reiseimpfungen, verfügbar unter: Epidemiologisches Bulletin 14/2025, Zuletzt aufgerufen 06.2025.

FÜR REISENDE AB 12 JAHREN: VIMKUNYA® GEGEN CHIKUNGUNYA

TOTIMPFSTOFF & VLP TECHNOLOGIE

Virusähnliche Partikel (VLP)
ahmen das Virus nach, ohne
eine Erkrankung auszulösen¹

SCHNELLE ANSPRACHE

Schon ab dem 14. Tag
nach der Impfung konnte
ein robuster Immunschutz
nachgewiesen werden^{1,*}

GUTES SICHERHEITSPROFIL

Die häufigste lokale bzw.
systemische Nebenwirkung
waren Schmerzen an
der Injektionsstelle bzw.
Ermüdung/Fatigue¹

IMMUNSCHUTZ FÜR EINE BREITE BEVÖLKERUNGSGRUPPE

Vimkunya ist zugelassen
für Jugendliche und
Erwachsene ab 12 Jahren^{†††}

VLP=Virusähnliche Partikel (virus like particle) *Die Seroresponse-Rate wurde als der Prozentsatz der Probanden definiert, die einen Anti-Chikungunya-SNA-NT80-Titer ≥ 100 erreichten. [†]Vimkunya® ist kontraindiziert bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder die Hilfsstoffe. ^{††}Vimkunya ist zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung von durch das Chikungunya-Virus verursachten Krankheiten bei Personen ab 12 Jahren indiziert. Dieser Impfstoff sollte gemäß den offiziellen Empfehlungen verwendet werden. Vimkunya wurde nicht bei schwangeren oder immundefizienten Personen oder bei Personen, die systemische immunsuppressive Therapien anwenden, untersucht. Personen, die immungeschwächt sind, einschliesslich Personen, die eine immunsuppressive Therapie erhalten, können eine verminderte Immunantwort auf Vimkunya haben. Die Verabreichung von Vimkunya während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Betracht gezogen werden, wenn die potenziellen Vorteile die potenziellen Risiken für Mutter und Fötus überwiegen.¹

Referenzen: 1. RKI Epidemiologisches Bulletin, 28/2025 2. Fachinformation Vimkunya, Februar 2025.

VIMKUNYA, Suspension zur i.m. Injektion in einer Fertigspritze. Wirkstoff: Chikungunya Impfstoff, rekombiniert, adsorbiert. **Zusammensetzung:** Eine Dosis (0,8ml) enthält 40µg Chikungunya Virus (CHIKV) Virus-ähnliche Partikel (VLP), adsorbiert an 300 µg Aluminiumhydroxid. Produziert in humanen embryonalen Nierenzellen mittels rekombinanter DNA-Technologie. Grundlage VLP: CHIKV Senegal Stamm 37997. **Hilfsstoffe:** Saccharose, Kaliummonohydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriumcitrat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiet:** Aktive Immunisierung zur Vorbeugung einer Erkrankung mit dem Chikungunya Virus für Personen ab 12 Jahre. Der Impfstoff soll gemäß den offiziellen Empfehlungen eingesetzt werden. Applikation i.m.; keine intravenöse, intradermale oder subkutane Gabe. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen anderen der aufgeführten Hilfsstoffe. **Warnhinweise:** Im seltenen Fall einer anaphylaktischen Reaktion sollten stets entsprechende medizinische Behandlungs- und Überwachungsmöglichkeiten sofort verfügbar sein. Die Sicherheit und Wirksamkeit bei immungeschwächten Patienten und solchen mit systemischer immunsuppressiver Therapie wurde nicht untersucht. Die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs wurden in der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe unter 12 Jahren nicht untersucht. **Nebenwirkungen: Sehr häufig:** Kopfschmerzen, Ermüdung/Fatigue, Schmerzen an der Injektionsstelle, Myalgie. **Häufig:** Schüttelfrost, Unwohlsein, Arthralgie, Übelkeit. **Gelegentlich:** Rötung, Schwellung oder blauer Fleck an der Injektionsstelle, Fieber, Schwindelgefühl, Nasenverstopfung, Ausschlag. **Selten:** Parästhesie, Diarrhö, Schmerzen in einer Extremität, Lippe geschwollen, Lymphadenopathie, Gastroenteritis, Schmerzen im Oropharynx, Rhinorrhö. **Verschreibungspflichtig. Inhaber der Zulassung:** Bavarian Nordic A/S, Philip Heymans Alle 3, 2900 Hellerup, Dänemark. **Stand der Fachinformation:** Februar 2025. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Nebenwirkungsmeldungen richten sie ggf. an: drug.safety@bavarian-nordic.com. | DE-VIM-2500002